

Что говорить другу, рассказавшему, что у него ВИЧ



Избегай

Как ты заразился, кто тебя этим «наградил»?

Сколько тебе осталось?

Почему-то я не удивлен

Я же не заражусь от тебя?

Говори



Ты не один!

Я с тобой, я поддержу тебя

Ты уже начал лечение?

Я очень ценю, что ты рассказал мне об этом

Чтобы узнавать о ВИЧ, важно задавать вопросы, но помните, что для этого нужно время и место. Сейчас вашему другу нужна поддержка! Будьте тактичны и не ставьте его в неловкое положение

Берегите себя
Своё здоровье
Свою жизнь!!!
Больше информации:
8(3842) 51-03-32,
www.kemspid.ru



ОСТОРОЖНО!

СПИД



ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает защитную систему организма - человек становится ВИЧ-инфицированным.

Носители ВИЧ могут даже не подозревать, что инфицированы, и передать вирус другим людям практически сразу с момента инфицирования. Большинство людей - носителей ВИЧ **выглядят здоровыми и чувствуют себя хорошо** в течение продолжительного времени после заражения (иногда до 10 лет). **СПИД** является следствием воздействия ВИЧ на организм человека. СПИД развивается у людей с ВИЧ, когда иммунная система разрушена.

Обнаружить ВИЧ в организме можно примерно **через 3-6 месяцев** после заражения только с помощью специального анализа крови.




ВИЧ может передаваться только тремя путями:

1 **Половым** - при сексуальных контактах без презерватива - через сперму и влагалищные выделения.

2 **Через кровь** - при попадании в организм инфицированной крови - при использовании нестерильных игл и шприцев при введении наркотиков, нестерильных инструментов для пирсинга и татуажа, при совместном с ВИЧ-инфицированным использовании бритв и бритвенных лезвий.

3 **От матери к ребенку** - во время беременности, при прохождении через родовые пути, при кормлении грудью.




Принято считать СПИД болезнью социальной, ее распространение определяется отношениями между людьми в обществе.



ВИЧ не передается:

- Через слезы, слюну, пот, мочу, при кашле;
- Через укусы насекомых;
- Через бытовые предметы, посуду, одежду, пищу;
- При пользовании общим туалетом, баней, душем, бассейном;
- В транспорте, при рукопожатии, разговоре.



В России в настоящее время стандартной процедурой лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к ВИЧ с последующим подтверждением их в реакции иммунного блоттинга.